

PROGRAMA SUGERIDO DE CONTROL de Lobesia botrana
en
Uva de Mesa (Vitis vinífera)

Temporada 2016-2017

Elaborado por: Roberto H. González, MSc., Ph.D., Asesor de ASOEX, y el Comité de Uva de Mesa de ASOEX.

Las presentes sugerencias de manejo fitosanitario de la polilla europea de la vid están enmarcadas en las normativas del Programa Nacional de *Lobesia botrana* 2016-2017 emitido por el Servicio Agrícola y Ganadero y en las Autorizaciones Oficiales de Plaguicidas para *Lobesia* del presente año. Respecto al seguimiento de los períodos de aplicación en la actual temporada será necesario que los interesados se informen del comportamiento de los ciclos de vuelo de cada una de las 3 generaciones del insecto, para que las presentes sugerencias puedan ajustarse en términos de momentos de aplicación y tipo de plaguicidas autorizados a aplicar especialmente de acuerdo a la fenología que presente la vid.

En la toma de decisiones de control respecto a la elección de las formulaciones químicas o biológicas autorizadas y con el objetivo de reducir el número de tratamientos de insecticidas, también se proponen posibilidades de control de doble propósito contra otras plagas comunes presentes en la uva de mesa o vinífera (ej. chanchitos blancos, burrito de la vid, polillas del género *Proeulia*, conchuelas, escamas y otras plagas) que puedan ocurrir simultáneamente en los predios a tratar, y cuyo desarrollo obviamente se encuentre en una fase susceptible, así coincidiendo con las aplicaciones mandatorias contra *Lobesia* las cuales decidirán todas las fechas de aplicación según su ciclo biológico y también de acuerdo a los períodos de protección indicados para cada uno de los plaguicidas autorizados; es decir que se debe considerar “como mínimo la protección de cada generación de la plaga (3) por un periodo de 30 días continuos o mientras exista fruta en el huerto”. Por lo tanto, la elección de los productos a utilizar será de responsabilidad de los productores, quienes deberán además verificar los periodos de aplicación en cada localidad, sus días de protección contra la plaga y los respectivos días de carencias para cumplir con las tolerancias exigidas según cada mercado de importación, antecedentes proporcionados por la Agenda de Pesticidas de ASOEX.

Es importante destacar que el Control de esta plaga es diferente según sea la Estrategia que se utilice y el lugar de Chile donde se encuentre:

A. Predios en Áreas de Control en las Regiones de **ERRADICACION** => Atacama, Coquimbo, Valparaíso y Bio Bio

	GENERACIONES		
	PRIMERA	SEGUNDA	TERCERA
Predios CON Capturas CON Confusores Sexuales (ECS) Entregados por el SAG	Aplicar insecticidas teniendo un periodo mínimo de 30 días continuos o mientras exista fruta en el huerto. Considerar periodo de Protección y Carencia de los productos	Aplicar insecticidas teniendo un periodo mínimo de 30 días continuos o mientras exista fruta en el huerto. Considerar periodo de Protección y Carencia de los productos	Aplicar insecticidas teniendo un periodo mínimo de 30 días continuos o mientras exista fruta en el huerto. Considerar periodo de Protección y Carencia de los productos
Predios SIN Capturas CON Confusores Sexuales (ECS) comprados por el productor dentro del Área de CONTROL de 500 mts.	No aplicar insecticida en forma obligatoria	No aplicar insecticida en forma obligatoria	No aplicar insecticida en forma obligatoria
Predios CON Captura y SIN Confusores Sexuales (ECS) y dentro del Área de CONTROL de 500 mts.(Predio Positivo)	Aplicar insecticidas teniendo un periodo mínimo de 30 días continuos o mientras exista fruta en el huerto. Considerar periodo de Protección y Carencia de los productos	Aplicar insecticidas teniendo un periodo mínimo de 30 días continuos o mientras exista fruta en el huerto. Considerar periodo de Protección y Carencia de los productos	Aplicar insecticidas teniendo un periodo mínimo de 30 días continuos o mientras exista fruta en el huerto. Considerar periodo de Protección y Carencia de los productos
Predios SIN Capturas y SIN Confusores Sexuales (ECS) pero dentro del Área de CONTROL de 500 mts.	Aplicar insecticidas teniendo un periodo mínimo de 30 días continuos o mientras exista fruta en el huerto. Considerar periodo de Protección y Carencia de los productos	Aplicar insecticidas teniendo un periodo mínimo de 30 días continuos o mientras exista fruta en el huerto. Considerar periodo de Protección y Carencia de los productos	Aplicar insecticidas teniendo un periodo mínimo de 30 días continuos o mientras exista fruta en el huerto. Considerar periodo de Protección y Carencia de los productos
Predios SIN Capturas y SIN Confusores Sexuales (ECS) pero dentro del Área de REGULADA de 3 km.	No aplicar insecticida en forma obligatoria	No aplicar insecticida en forma obligatoria	No aplicar insecticida en forma obligatoria

B. Predios en Áreas de Control en las Regiones de **CONTENCIÓN** => Metropolitana, O'Higgins y Maule

	GENERACIONES		
	PRIMERA	SEGUNDA	TERCERA
Predios CON Capturas CON Confusores Sexuales (ECS) Entregados por el SAG	<p><u>*Según la Estrategia Nacional de Control Obligatorio del SAG:</u> Aplicar insecticidas teniendo un periodo mínimo de 30 días continuos o mientras exista fruta en el huerto. Considerar periodo de Protección y Carencia de los productos. También si en la Temp 2015-16 se tuvo CTD \geq a 0,4 o en el predio donde se encontró algún Estado Inmaduro.</p> <p><u>*Según ASOEX:</u> Se debe aplicar insecticidas en este periodo para así disminuir probabilidades de infestación, cubriendo los 30 días del vuelo. Considerar periodo de Protección y Carencia de los productos.</p>	<p><u>*Según la Estrategia Nacional de Control Obligatorio del SAG:</u> No aplicar insecticidas en forma obligatoria.</p> <p><u>*Según ASOEX:</u> Se sugiere aplicar insecticidas en este periodo para así disminuir probabilidades de infestación, idealmente cubriendo los 30 días del vuelo. Considerar periodo de Protección y Carencia de los productos.</p>	<p><u>*Según la Estrategia Nacional de Control Obligatorio del SAG:</u> No aplicar insecticidas en forma obligatoria.</p> <p><u>*Según ASOEX:</u> Se sugiere aplicar insecticidas en este periodo por la pérdida de efectividad de los Confusores Sexuales en la medida que haya fruta presente y si es más tarde de principios de Marzo. Considerar periodo de Protección y Carencia de los productos.</p>
Predios SIN Capturas CON Confusores Sexuales (ECS) comprados por el productor dentro del Area de CONTROL de 500 mts.	<p><u>*Según la Estrategia Nacional de Control Obligatorio del SAG:</u> Aplicar insecticidas teniendo un periodo mínimo de 30 días continuos o mientras exista fruta en el huerto. Considerar periodo de Protección y Carencia de los productos. También si en la Temp 2015-16 se tuvo CTD \geq a 0,4 o en el predio donde se encontró algún Estado Inmaduro.</p> <p><u>*Según ASOEX:</u> Se debe aplicar insecticidas en este periodo para así disminuir probabilidades de infestación, cubriendo los 30 días del vuelo. Considerar periodo de Protección y Carencia de los productos.</p>	<p><u>*Según la Estrategia Nacional de Control Obligatorio del SAG:</u> No aplicar insecticidas en forma obligatoria.</p> <p><u>*Según ASOEX:</u> Se sugiere aplicar insecticidas en este periodo para así disminuir probabilidades de infestación, idealmente cubriendo los 30 días del vuelo. Considerar periodo de Protección y Carencia de los productos.</p>	<p><u>*Según la Estrategia Nacional de Control Obligatorio del SAG:</u> No aplicar insecticidas en forma obligatoria.</p> <p><u>*Según ASOEX:</u> Se sugiere aplicar insecticidas en este periodo por la pérdida de efectividad de los Confusores Sexuales en la medida que haya fruta presente y si es más tarde de principios de Marzo. Considerar periodo de Protección y Carencia de los productos.</p>

Predios CON Captura y SIN Confusores Sexuales (ECS) y dentro del Área de CONTROL de 500 mts.(Predio Positivo)	Aplicar insecticidas teniendo un periodo mínimo de 30 días continuos o mientras exista fruta en el huerto. Considerar periodo de Protección y Carencia de los productos.	Aplicar insecticidas teniendo un periodo mínimo de 30 días continuos o mientras exista fruta en el huerto. Considerar periodo de Protección y Carencia de los productos.	Aplicar insecticidas teniendo un periodo mínimo de 30 días continuos o mientras exista fruta en el huerto. Considerar periodo de Protección y Carencia de los productos.
Predios SIN Capturas y SIN Confusores Sexuales (ECS) pero dentro del Área de CONTROL de 500 mts.	Aplicar insecticidas teniendo un periodo mínimo de 30 días continuos o mientras exista fruta en el huerto. Considerar periodo de Protección y Carencia de los productos	Aplicar insecticidas teniendo un periodo mínimo de 30 días continuos o mientras exista fruta en el huerto. Considerar periodo de Protección y Carencia de los productos.	Aplicar insecticidas teniendo un periodo mínimo de 30 días continuos o mientras exista fruta en el huerto. Considerar periodo de Protección y Carencia de los productos.
Predios SIN Capturas y SIN Confusores Sexuales (ECS) pero dentro del Área de REGULADA de 3 km.	No aplicar insecticida en forma obligatoria	No aplicar insecticida en forma obligatoria	No aplicar insecticida en forma obligatoria

ASPECTOS GENERALES SOBRE EL CONTROL QUIMICO DE LOBESIA

1. Control de la PRIMERA Generación de Lobesia

Debe destacarse que, junto con los primeros antecedentes del inicio de vuelo de la polilla según datos de las trampas de feromona, los productores deberán conocer el estado de desarrollo de las estructuras florales de las variedades de vid, ya que los adultos, comenzarán su postura de huevos entre estas estructuras desde poco antes de la apertura de la flor, prosiguiendo sobre las bayas recién cuajadas. La composición del vuelo está primeramente marcada por la presencia de machos, seguido a los 4-5 días siguientes por las hembras y luego por el respectivo comienzo del acoplamiento, y deposición escalonada de huevos.

En la actual lista de autorizaciones aparecen dos insecticidas del grupo Aceleradores de muda, el Metoxifenoazida (Intrepid SC) y el Tebufenoazida (Mimic F) , ambos con propiedades larvicidas que podrán aplicarse más temprano, igualmente que el Ampligo 150 ZC (clorantropilprole más L-cihalotrina), o bien larvicidas por contacto como el Indoxacarb (Avaunt 30 WG), Coragen (clorantropilprole), Belt 480 SC (flubendiamida), Voliam Flexi 300 SC (clorantropilprole y tiametoxam), que posee control simultáneo de Lobesia y chanchitos blancos y el espinoteram (Delegate). También se han autorizado otras formulaciones larvicidas de acción conjunta contra plagas picadoras-chupadoras como el acetamiprid (Acetamiprid 70 WP Agrospec, Hurricane 70 WP, y Mospilan 20 SP), bifentrin (Bifentrin 10 EC, contra trips y arañas), y clorpirifos (Lorsban 75 WP, Pyrinex CS), con las debidas tolerancias según los mercados de destino, todos estos productos de doble propósito. Entre los larvicidas de origen biológico que actúan por ingestión, está el *Bacillus thuringiensis*, de cepas y concentraciones distintas que se han empleado en tratamientos orgánicos, (BTK-03 WP, Dipel WG y Javelin WG).

Entre los piretroides aparecen autorizados el esfenvalerato (Halmark 75 EC), la gamma cihalotrina (Bull), lambda cihalotrina (Karate con tecnología Zeon y L-cihalotrina 5 EC Agrospec), y la fenpropatrina (Danitol), todos los cuales, aparte de la Lobesia, presentan acción contra otras plagas, especialmente aquellas de cuerpo blando.

2. Control de la SEGUNDA Generación de Lobesia

Esta primera generación carpófaga (que atacan los frutos) corresponde al tratamiento que se debe aplicar inmediatamente al inicio del segundo vuelo que puede traslaparse con el final del primer vuelo y después con el inicio del tercer vuelo. El estado fenológico de la vid puede corresponder al "apriete de racimos", pinta o inicio de madurez. En uva de mesa de cosecha temprana deberán emplearse los insecticidas con menores riesgos de residuos. Es importante recalcar que se deben realizar las aplicaciones necesarias para cubrir un periodo continuo de 30 días desde el aviso que realiza el SAG periódicamente, considerando los periodos de Protección y de Carencia que cada producto tiene.

Los plaguicidas a emplear pueden incluir: acetamiprid (preferiblemente en el control inicial de esta generación), clorantropilprole (sólo en sus mezclas comerciales), Emamectina (hasta 2 aplicaciones), indoxacarb, piretroides, bifentrin, aceleradores de muda (en aplicaciones iniciales), espinoteram, etofenprox (Trebon 30 EC) y *Bacillus thuringiensis*. Clorpirifos deberá ser excluido para el mercado europeo en uva de mesa, no así en uva vinífera porque sus residuos no pasan al vino.

3. Control de la TERCERA Generación de Lobesia

Contra la **Tercera Generación** deben sugerirse las aplicaciones necesarias, según la fecha de cosecha considerando los posibles riesgos de residuos tanto en uva de mesa como vinífera. Los productos a utilizar pueden ser los mismos empleados en la Segunda Generación anteriormente mencionados, pudiendo también incluir productos de origen biológico como *Bacillus thuringiensis*. Si existen otras plagas importantes deberá buscarse aquellos productos autorizados de acción conjunta contra otras plagas. Tener en cuenta que el número de aplicaciones en esta generación depende de los días de protección del o los productos utilizados, pensando en tener cubierto el periodo de días que comprende esta generación de acuerdo a lo que indica el SAG o mientras exista presencia de fruta en las plantas, ya sea para exportación como para mercado interno (en fresco, para pasas, para vinificación, etc.).

En caso de utilizar *Bacillus thuringiensis*, tener en cuenta que estos productos tienen un corto período de protección, no más allá de 7 días como máximo.

Es importante mencionar que en los predios que utilizan Confusión Sexual (ECS) y que tienen variedades que se cosechan tarde en la temporada, vale decir de Marzo en adelante, tales como Red Globe, Crimson, etc., es recomendable que refuercen el programa de control en este periodo realizando algunas aplicaciones de productos químicos ya que los confusores duran entre 150 a 180 días. Esto es fundamental para los predios que están destinados a exportar a mercados como Corea, Canadá, México en los cuales no se permite ningún estado inmaduro en el predio. Esto mismo tiene relevancia también con otros mercados tales como China y otros países con los cuales el SAG tiene acuerdos vigentes por lo que se hace necesario disminuir la presión de la plaga en esta generación.

CONSIDERACIONES GENERALES

Tener presente que, dependiendo de las distintas regiones del país, el SAG históricamente ha informado para el inicio del Control Obligatorio de cada uno de los vuelos que equivalen a cada generación, los siguientes periodos generales:

Primera generación : primeros días de Octubre
Segunda generación : mediados de Diciembre
Tercera generación : inicios de Febrero

Cada productor deberá identificar la Zona de Alerta en la cual se encuentra su huerto, información disponible en la página web del SAG y en las oficinas SAG de su localidad. Por lo tanto, se debe tener en cuenta claramente las fechas de inicio de las aplicaciones que da el SAG

para cada generación en cada zona, y el huerto debe estar protegido al menos 30 días desde el inicio de las aplicaciones para cada generación, o mientras exista fruta presente en el huerto.

También es importante recalcar que el productor está obligado a informar al SAG con al menos 2 días hábiles de anticipación cada una de las aplicaciones químicas contra esta polilla que utilizará en su predio.

Otros puntos importantes para lograr combatir esta plaga, son:

- Para cada generación, realizar aplicaciones extras de los bordes de los huertos para así asegurarse que dichas zonas hayan quedado bien cubiertas.
- Considerar que tipo de vegetación existe en los cercos ya que puede ser un reservorio de esta plaga por lo que se debe analizar considerar aplicar sobre ella, además en las aplicaciones de los bordes.
- En caso de estar cerca de zonas pobladas, tratar de establecer con los vecinos programas de control químico acorde a su condición particular utilizando productos que no afecten a los seres humanos, sus mascotas, etc.; o en su defecto utilizar controles culturales, tales como poda, remoción de las inflorescencias y/o racimos desde una etapa temprana, descortezado de plantas, entre otras. En estas áreas realizar este punto es muy significativo ya que las parras de las casas son una fuente muy importante de inóculo.

Las recomendaciones contenidas en este programa fitosanitario, así como los productos fitosanitarios mencionados, se indican en calidad de sugerencia, no recayendo en ASOEX cualquier responsabilidad por su uso.

Se adjunta cuadro recabado de la Agenda de pesticidas de la ASOEX, en donde se indican los Límites Máximos de Residuos (LMR) y los Días de Carencia para cada producto que ha mencionado el SAG para el Control de Lobesia, señalando claramente que estos son para Uva de Mesa a la fecha de actualización que se indica en él.

Santiago, Octubre 2016